

ANTIÉPILEPTIQUES CONTRE-INDIQUÉS, À NE PAS UTILISER



Certains antiépileptiques peuvent **augmenter le taux de glycine** ou **perturber son métabolisme**. Chez une personne atteinte d'hyperglycémie sans cétose, cela peut aggraver le déséquilibre biochimique déjà présent.



Le LCR (liquide céphalo-rachidien) contient déjà un excès de glycine à cause de cette maladie. Une augmentation supplémentaire peut donc intensifier les **crises épileptiques**, **l'encéphalopathie** et **l'instabilité neurologique**.



Toute décision concernant les médicaments doit être prise avec un **spécialiste des maladies métaboliques** connaissant cette pathologie.

LES ANTIÉPILEPTIQUES CONCERNÉS



VIGABATRINE

Nom commercial : **Sabril®**



VALPROATE (VALPROATE DE SODIUM)

Nom commercial : **Dépakine®**, ...



PHENYTOÏNE

Nom commercial : **Dilantin®**, ...



L'association Les Petits Bourdons

11 rue Rouget de Lisle
72650 La Chapelle St Aubin France

Email : lespetitsbourdons@gmail.com



Site : www.lespetitsbourdons.fr



Toutes les informations présentes sur ce support ont été transmises généreusement par NKH Crusaders à l'association des Petits Bourdons.